

新型コロナウイルスワクチン 追加（3回目）接種のご案内

サンシャインサカエ
ひだまりコロナワクチン
職域接種会場



追加（3回目）接種について

ワクチンは、感染予防効果や、高齢者においては重症化予防効果についても、時間の経過に伴い、徐々に低下していくことが示唆されています。

このため、感染拡大防止及び重症化予防の観点から、初回（1回目・2回目）接種を完了したすべての方に対して、追加接種の機会を提供することが望ましいとされています。

—POINT—

●追加接種の対象

2回目の接種から**6か月以上**経過した方
18歳以上の方（現時点）

●接種券

接種券の持参が原則必須

※接種券は2回目接種日に基づき、各自治体から発送



追加（3回目）接種について②

1,2回目接種との違い

	1, 2回目接種	3回目接種
対象年齢	12歳以上	18歳以上(現時点)
接種券	職域接種では後日提出で接種可能	原則接種時に提出必須
接種間隔	1回目接種日から3~4週間 ※ファイザー 3W/モデルナ 4W	2回目接種日から6ヶ月
交接種	原則1, 2回目は同じワクチンを接種	1, 2回目のワクチン種類に関わらず ファイザー社、モデルナ社のワクチン接種可能
接種量	ファイザー 0.3ml モデルナ 0.5ml	ファイザー 0.3ml モデルナ 0.25ml (半分の量)



職域接種について

感染拡大防止並びに地域の負担軽減の為、
企業や学校単位での職域追加接種を実施

1,2回目接種との違い

	1, 2回目接種	3回目接種
ワクチン	武田モデルナ社製ワクチンを使用	
会場・医療従事者の確保	企業や大学等が自ら確保 ①企業内診療所で実施 ②外部機関が出張して実施 ③外部機関に出向いて実施 のいずれかにて実施	
申請要件	下記、申請人数以上の企業・大学等	1, 2回目接種にて職域接種を実施した 企業・大学等のみ申請可
職域接種実施に必要な申請人数	1会場1,000人以上	1会場500人以上
接種費用	接種者様は費用負担無し	接種者様は費用負担無し
ワクチン配送	週に1回	2週間に1回

2月21日よりワクチンが配送され、届いた会場から順次実施
当会場では、2月22日（火）より職域接種を実施予定となります。



注意事項

●他のワクチンとの接種間隔（インフルエンザ、風疹等）

→互いに片方のワクチン接種から2週間後に接種が可能

※厚労省Q&Aより (<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0037.html>)

●新型コロナウイルスに感染した後にワクチンを接種する場合

→治療から90日間開けることを推奨

治療後90日以内の再感染は稀であることから、ワクチンの接種は当該治療から90日間開けることを推奨

※厚労省Q&Aより (<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0028.html>)



副反応

● ワクチンによる副反応の違い

一部症状の出現率に差はあるものの、1, 2回目と同様の副反応があります。
接種後の症状のうち、リンパ節症は3回目の方が多く見られています

▶ ファイザー社のワクチンにおける3回目接種
2回目の接種後と比較して発熱や頭痛などの接種後症状が少ない

発現割合	ファイザー社(2回目→3回目の症状発現割合)
50%以上	疼痛 (78.3%→83.0%) 疲労 (59.4%→63.7%)
10~50%	頭痛 (54.0%→48.4%) 筋肉痛 (39.3%→39.1%) 悪寒 (37.8%→29.1%) 関節痛 (23.8%→25.3%)
1~10%	38度以上の発熱 (16.4%→8.7%) 腫脹 (6.8%→8.0%) 発赤 (5.6%→5.9%) リンパ節症 (0.4%→5.2%)

▶ モデルナ社のワクチンにおける3回目接種
2回目の接種後と比較して発熱や疲労などの接種後症状が少ない

発現割合	武田/モデルナ社(2回目→3回目の症状発現割合)
50%以上	疼痛 (88.3%→83.8%) 疲労 (65.4%→58.7%) 頭痛 (58.8%→55.1%)
10~50%	筋肉痛 (58.1%→49.1%) 関節痛 (42.9%→41.3%) 悪寒 (44.3%→35.3%) リンパ節症 (14.2%→20.4%)
1~10%	38度以上の発熱 (15.5%→6.6%) 腫脹・硬結 (12.3%→5.4%) 紅斑・発赤 (8.7%→4.8%)

副反応

その他の副反応

- 心筋炎

ごく稀に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています

- リンパ節症

接種側の脇の下や首などのリンパが腫れる事例が報告されています

- 充填剤による腫れ

皮膚充填材注入治療を受けた方でワクチン接種後に注入部位が腫れたという事例が報告されています

スパイクバックス筋注添付文書より (https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/631341EA1038_1_02/)



副反応①

接種後症状：迷走神経反射

- **起きやすい人**

10代から20代前半の女性

- **メカニズム**

緊張や疲労の状態でワクチン接種などの注射の痛み刺激をきっかけに副交感神経が活発になり、血圧や心拍数が急に下がることで起きる

- **症状**

血の気の引く感じ、めまい、ふらつき、吐き気、症状が強い場合気を失う
ワクチン接種直後を含め多くの方が15分以内に症状出現



副反応①

接種後症状：迷走神経反射

●接種前の対処法

空腹時、睡眠不足で症状が出やすい

→前日は十分な睡眠時間の確保、接種前の食事

緊張時に症状が出やすい

→家族や友人の付き添いも可能

●当日の対処法

接種時は針を見ない、横になった状態で接種する

接種後・待機後はゆっくりと立ち上がり、数秒待ってから歩き出す

希望があれば会場にて30分待機も可能



副反応②

接種後症状：アナフィラキシー

- アナフィラキシーとは

薬や食べ物が身体に入り、短時間で起きるアレルギー反応

- 症状

眩暈やふらつき、血の気の引く感じなどの血圧低下

+

蕁麻疹などの皮膚症状や吐き気など消化器症状

息苦しさなどの呼吸器症状



サンシャインサカエ ひだまりコロナワクチン職域接種会場について

●時期

2月22日（火）～

★当会場では3回目接種のみ実施しています

●場所

名城線・東山線「栄駅」8番出口と地下直結
サンシャインサカエ3階

●ワクチン

武田/モデルナ社ワクチン

●費用

接種者様も企業様も完全無料

朝から夜まで
選べる日時



サンシャインサカエ

ひだまりコロナワクチン職域接種会場について

●対象

2回目接種日から6ヶ月経過した18歳以上の方
接種券が届いた方

●持物

接種券一体型予診票、身分証明書

●予約

LINEの予約システム「Lacoon」で簡単予約
当日でも空きがあればリアルタイムで予約可能



企業様向けHP



近隣住民様向けHP



予約QRコード



(追加) 追加接種をおすすめします

厚生労働省の発表より

追加接種の予約枠に空きがあれば、一般の方も前倒し（6ヶ月）

で3回目のワクチン接種が受けられるようになりました

☆特に接種をおすすめする方（厚生労働省より）

- ・ 高齢者や基礎疾患を有する方など「重症化リスクが高い方」
- ・ 重症化リスクが高い方の関係者・介助者など
- ・ 医療従事者などの「職業上の理由などによりウイルス曝露リスクが高い方」

☆上記に加え、当院として

- ・ 人が密になる場所に行く方、行く機会の多い方
- ・ 人と接する機会の多い接客業に従事している方
- ・ 妊娠中、妊娠を予定している方

ぜひ接種をご検討ください！

『愛知県にお住まいの方へ。 近隣住民様としての職域接種を行っております』

名古屋・栄のひだまりコロナワクチン職域接種会場は、**41団体5,000社**にて登録申請されている職域接種会場で医療法人 山陽会・株式会社 ファーマスターが監修運営をしております。

登録されている団体事業者や関係者企業様はもちろんの事、近隣住民様方のワクチン接種のニーズに応える体制づくりをかねてから協議しており、少しでも多くのワクチン接種を希望されている方が接種を受けられるように調整を図ってまいりました。

当会場における取り組みを通して、地域自治体の負担軽減や、感染の早期終息につながるだけでなく、地域自治体の負担軽減に貢献できることを目指しております。



<主催>

医療法人山陽会 ひだまりこころクリニック



ひだまりこころクリニック
名駅エスカ院



ひだまりこころクリニック
あま市本院



ひだまりこころクリニック
金山院



ひだまりこころクリニック
サンシャインサカ工程院

お問い合わせ

☎ 080-9675-6171 ☎ 080-9675-5968 ☎ 080-9675-5830

Mail:hidamarikokoro.honbu@gmail.com

<協力>株式会社ファーマスター



株式会社
ファーマスター